

Adenuric® (Febuxostat)

Limitatio: Behandlung der chronischen Hyperurikämie bei Erkrankungen, die bereits zu Uratablagerungen geführt haben (einschliesslich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis) bei erwachsenen Patienten, bei denen Allopurinol sich als nicht genügend wirksam erweist oder die auf Grund von Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten mit Allopurinol nicht behandelt werden können. Die maximale tägliche Dosierung beträgt 80 mg. Siehe auch [SL](#).

Personalien Patient:

Name: Vorname: Geb. Datum

Geschlecht: ♀ ♂ Strasse: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt): Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Medizinische Daten (ausschliesslich für den Vertrauensarzt bestimmt):

Patientin/Patient ist an einer chronischen Hyperurikämie erkrankt, welche bereits zu Uratablagerungen geführt haben

Zur Vorbehandlung:

- Die Therapie mit Allopurinol hat sich als nicht genügend wirksam erwiesen.
 Es lagen Unverträglichkeiten vor Es kam zu Nebenwirkungen
 Patientin/Patient kann nicht mit Allopurinol behandelt werden.

Kurze Beschreibung der Vorbehandlung mit Allopurinol oder der Unmöglichkeit derselben sowie der eventuellen Unverträglichkeiten/Nebenwirkungen:

Zur Behandlung mit Adenuric®, initiale Dosierung:

40 mg täglich 80 mg täglich andere, nämlich: mg täglich

Anfragender Arzt/Ärztin

Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Ort:

Tel. Fax: E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals: Abteilung:

Datum: