

Indication autorisée par Swissmedic, extrait ([Swissmedicinfo](#)): Libtayo en monothérapie est indiqué pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde cutané métastatique, ou de carcinome épidermoïde cutané localement avancé, qui ne sont pas éligibles à une chirurgie curative ou à une radiothérapie curative.

Donné(e)s du patient / de la patiente:

Nom: Prénom: Né(e) le:

sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance: N° d'assurance:

Adresse Assureur (Service de médecin-conseil ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Données médicales (destinées exclusivement au médecin-conseil).

Le patient souffre d'un carcinome épidermoïde cutané avancé depuis (MM/AAAA):

localement avancé métastatique

Le patient n'est pas candidat à une chirurgie curative ou à une radiothérapie curative. Veuillez donner une brève explication:

Diagnostic(s) secondaire(s):

Veuillez décrire brièvement le prétraitement du patient:

Dosage proposé : selon l'information professionnelle. Monothérapie. 350mg i.v. : toutes les 3 semaines

Début prévu du traitement: (MM/AAAA):

Alternatives thérapeutiques? Raisons du choix de la thérapie avec Libtayo® (veuillez joindre les publications):

Compléments/Remarques:

Médecin requérant:

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA:

Lieu:

Tél.:

Fax:

e-mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital:

Département:

Date: