

# MVASI® (Bevacizumab)

## Traitement du cancer, demande urgente

Demande de prise en charge des coûts, à l'attention du médecin-conseil

Limitatio: voir Liste des spécialités.

Pour les indications suivantes: **carcinome ovarien, carcinome de la trompe, carcinome péritonéal primaire, cancer du col utérin**

### Données de la patiente:

Nom:	<input type="text"/>	Prénom:	<input type="text"/>	née le:	<input type="text"/>
Rue:	<input type="text"/>	Complément d'adresse:	<input type="text"/>		
NPA:	<input type="text"/>	Lieu:	<input type="text"/>		

### Assurance-maladie:

Assurance-maladie:	<input type="text"/>	Numéro d'assurée:	<input type="text"/>
Adresse Assurance (Service du MC ou MC):	<input type="text"/>	Complément d'adresse:	<input type="text"/>
NPA:	<input type="text"/>	Lieu:	<input type="text"/>

### Diagnostic (destiné exclusivement au/à la médecin-conseil):

- La patiente souffre **d'un cancer de l'ovaire** en stade FIGO III ou IV et **n'est pas traitée préalablement**. La tumeur n'a pas pu être complètement réséquée et la patiente serait susceptible de ne pas profiter d'une nouvelle opération après la chimiothérapie (second look avec interval debulking). Un traitement par MVASI en association avec du carboplatine et du paclitaxel est prévu.
- La patiente souffre d'un:  **carcinome ovarien épithélial**  **carcinome de la trompe**  
 **carcinome péritonéal primaire**, qui est
- Récidivant et sensible au platine**. Un intervalle libre sans platine d'au moins 6 mois est présent. Un traitement par MVASI en association avec le carboplatine et la gemcitabine ou en association avec le carboplatine et le paclitaxel est prévu.
- Récidivant et résistant au platine**. La patiente n'a pas reçu plus de deux schémas chimiothérapeutiques antérieurs et n'a pas été préalablement traitée par le bévacizumab ou d'autres anti-VEGF. Un traitement par MVASI en combinaison avec le paclitaxel, le topotécan ou la doxorubicine liposomale pégylée est prévu.
- La patiente souffre d'un **cancer du col utérin** persistant, récidivant ou métastatique. Un traitement par MVASI en combinaison avec la chimiothérapie est prévu.

### Compléments/Remarques:

### Médecin demandeur:

Nom:	<input type="text"/>	Prénom:	<input type="text"/>
Adresse:	<input type="text"/>	Complément d'adresse:	<input type="text"/>
NPA:	<input type="text"/>	Lieu:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	Tél.:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>		
Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital:	<input type="text"/>	Département:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>		

**Limitatio (extrait):****Carcinome Ovarien**

Après accord sur la prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable et accord du médecin-conseil, pour le traitement des patientes atteintes d'un carcinome ovarien (stades FIGO III et IV) non prétraitées, chez lesquelles la tumeur n'a pas pu être complètement réséquée et qui seraient susceptibles de ne pas profiter d'une nouvelle opération après la chimiothérapie (second look avec interval debulking). Après 6 cycles en association avec le carboplatine et le paclitaxel, MVASI est remboursé pendant 15 mois, ou jusqu'à progression de la maladie selon ce qui survient en premier.

Après accord sur la prise en charge des frais par l'assureur-maladie après consultation préalable et accord du médecin-conseil, pour le traitement des patientes atteintes d'un carcinome ovarien épithélial, d'un carcinome de la trompe ou d'un carcinome péritonéal primaire, récidivant, sensible au platine (avec un intervalle libre sans platine d'au moins 6 mois), en association avec le carboplatine et la gemcitabine ou en association avec le carboplatine et le paclitaxel. Après 6 à 10 cycles en association avec le carboplatine et la gemcitabine ou en association avec le carboplatine et le paclitaxel pendant 6 à 8 cycles de traitement, MVASI est remboursé jusqu'à progression de la maladie.

MVASI est indiqué en combinaison avec le paclitaxel, le topotécan ou la doxorubicine liposomale pégylée dans le traitement des patientes atteintes d'un carcinome ovarien épithélial, d'un carcinome de la trompe ou d'un carcinome péritonéal primaire, récidivant et résistant au platine, qui n'ont pas reçu plus de deux schémas chimiothérapeutiques antérieurs et qui n'ont pas été préalablement traitées par le bévacizumab ou d'autres anti-VEGF. En cas de prescription médicale appropriée, après environ 6 cycles en combinaison avec le paclitaxel, le topotécan ou la doxorubicine liposomale pégylée, MVASI est remboursé jusqu'à progression de la maladie.

**Cancer du col utérin**

MVASI est indiqué en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col utérin persistant, récidivant ou métastatique. En cas de prescription médicale appropriée, après environ 7 cycles en combinaison avec la chimiothérapie, MVASI est remboursé jusqu'à progression de la maladie.