

**Limitatio:** Limitazione con scadenza al 30.09.2025

SPRAVATO viene rimborsato dopo garanzia di assunzione delle spese da parte dell'assicurazione malattie, previa consultazione del medico di fiducia, per il trattamento di adulti di età compresa tra 18 e 74 anni inclusi con un grave episodio di depressione maggiore resistente alla terapia, che, dopo almeno 2 diversi antidepressivi e 1 tentativo di aumento (con litio o un antipsicotico atipico), continuano ad avere episodi di depressione maggiore con un valore CGI-S  $\geq 5$  e per i quali una terapia interventistica, come la terapia elettroconvulsivante (ECT), non è attualmente indicata, è rifiutata dal paziente o in caso che il paziente non ha accesso a tale terapia, in combinazione con un antidepressivo orale. Prima di iniziare il trattamento, la gravità del disturbo depressivo deve essere confermata con un punteggio di  $\geq 5$  sulla Clinical Global Impression Scale (CGI-S). L'approvazione iniziale del rimborso è concessa per un periodo di 4 settimane. In caso di risposta sostenuta e dimostrata dopo 4 settimane, corrispondente a un miglioramento della CGI-S di  $\geq 2$  punti in 2 valutazioni entro le settimane 3 e 4 del trattamento, l'approvazione del rimborso può essere prolungata per 3 mesi.

Successivamente, se la risposta è sostenuta e dimostrata, l'approvazione del rimborso può essere prolungata al massimo altre due volte per un periodo di 3 mesi. SPRAVATO viene rimborsato per un massimo di 10 mesi. SPRAVATO è prescritto esclusivamente da specialisti in psichiatria e psicoterapia presso i centri definiti dall'UFSP, che sono istituzioni con mandato di prestazione cantonale per l'assistenza psichiatrica per adulti (per l'elenco, si veda <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>).

**Dati del paziente:**

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

 ♀  ♂

Via:

Altre informazioni sull'indirizzo:

NPA:

Località:

**Assicuratore:**

N. assicurato:

Indirizzo dell'assicuratore:

Altre informazioni sull'indirizzo:

NPA:

Località:

**Medico:**

Medico specialista in psichiatria et psicoterapia

L'istituzione figura su alla lista dei centri definiti dall'UFSP. (Lista vedi : <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>)

Nome dell'istituzione:

Cognome:

Nome:

Via:

NPA:

Località:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

**Dati medici**

Selezionare la corretta opzione e poi compilare la sezione corrispondente (A-C) del modulo per la richiesta di rimborso spese (vedi sotto).

Prima dell'inizio della terapia (→ sezione A)

Valutazione dopo 4 settimane di trattamento (→ sezione B)

Valutazione dopo 4 mesi di trattamento → sezione C)

Valutazione dopo 7 mesi di trattamento (→ sezione D)

**Sezione A – Prima dell'inizio della terapia**

Il paziente soffre di depressione e riempie i seguenti criteri (per il rimborso di Spravato® devono essere soddisfatti tutti i criteri indicati qui di seguito):

Età compresa tra 18 e 74 anni inclusi

Il paziente ha già avuto 2 antidepressivi distinti

Antidepressivi precedenti:

Quale(i) farmaco(i)?

dal (MM/AAAA)

al (MM/AAAA)

Informazioni sull'effetto:

Il paziente ha già ricevuto 1 aumento (con litio o un antipsicotico atipico)

Il CGI-S score prima d'iniziare il trattamento con Spravato® (deve essere  $\geq 5$ ):

Il CGI-S score prima d'iniziare il trattamento con Spravato® (deve essere  $\geq 5$ ).  
Spiegazione:

Spravato® viene prescritto in combinazione con l'antidepressivo seguente:

Data pianificata per l'inizio del trattamento con Spravato® (MM/AAAA):

Osservazioni:

#### Sezione B – Valutazione dopo 4 settimane di trattamento

Il paziente deve mostrare, tramite CGI-S alla settimana 3 e 4, un miglioramento del CGI-S di  $\geq 2$  rispetto all'inizio della terapia.

Il paziente continua di rispondere al trattamento con Spravato®. CGI-S prima dell'inizio terapia (5, 6 o 7):

Prima valutazione del CGI-S dopo inizio terapia (settimana 3 o 4):

Seconda valutazione del CGI-S dopo inizio terapia (settimana 3 o 4):

Osservazioni:

#### Sezione C – Valutazione dopo 4 mesi di trattamento

Il paziente deve mostrare una risposta, ossia un miglioramento della CGI-S di  $\geq 2$  punti rispetto al valore iniziale del trattamento.

Il paziente continua di rispondere al trattamento con Spravato®. CGI-S prima dell'inizio terapia (5, 6 o 7):

CGI-S del paziente dopo 4 mesi di trattamento:

Osservazioni:

#### Sezione D – Valutazione dopo 7 mesi di trattamento

Il paziente deve mostrare una risposta, ossia un miglioramento della CGI-S di  $\geq 2$  punti rispetto al valore iniziale del trattamento.

Il paziente continua di rispondere al trattamento con Spravato®. CGI-S prima dell'inizio terapia (5, 6 o 7):

CGI-S del paziente dopo 7 mesi di trattamento:

Osservazioni:

Data: